



令和7年度 フェロモントラップ等調査結果 セジロウンカ(予察灯)

1 調査結果

(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		中西部			南部		
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町		
周辺作物		水稻			水稻		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0.5	0
	3	0	0	0	0	0.1	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0.1	1
6月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0.2	0	1.0	0	0
	3		0.1	0	1.0	0	0
	4		0	0		1.6	2
	5		0	0		6.2	49
	6		1.9	14		4.0	24
7月	1		2.5	20		3.2	25
	2		0.6	4		1.2	0
	3		2.2	16		5.9	54
	4		1.1	10		4.1	10
	5		1.4	9		1.7	3
	6		1.1	3		1.9	1
8月	1		1.0	4		0.8	2
	2		1.4	0		1.2	2
	3		1.2	5		7.9	10
	4		3.4	6		17.3	8
	5		1.3	0		2.4	0
	6		2.4	0		17.1	0
9月	1		8.2	1		5.3	0
	2		2.6	1		1.9	0
	3		3.0	0		2.7	0
	4		0.6	0		6.0	0
	5		0.9	0		1.4	0
	6		0.7	0		2.7	0

呉市5/23-25欠測



「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果

トビイロウンカ(予察灯)

1 調査結果

(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		中西部			南部		
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町		
周辺作物		水稻			水稻		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0
6月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3		0	0	0	0	0
	4		0	0		0	0
	5		0	0		0.1	1.0
	6		0	0		0	0
7月	1		0	0		0	0
	2		0	0		1.2	0
	3		0	0		2.2	1.0
	4		0	0		0.2	0
	5		0	0		0.2	0
	6		0	1.0		0	0
8月	1		0	0		0	0
	2		0	0		0.5	0
	3		0	0		0.5	0
	4		1	0		0.4	0
	5		0	0		0.4	0
	6		1.1	0		10.1	0
9月	1		19.9	0		46.7	0
	2		8.5	0		22.9	0
	3		4.4	0		14.9	0
	4		2.2	1.0		2.8	0
	5		0.5	0		0.8	0
	6		2.6	0		8.0	0

呉市5/23-25欠測